

## FUORI PAN DI PSICHIATRIA

### 1. In quale percentuale di casi si può riscontrare una depressione con caratteristiche psicotiche

- 5%
- 19%
- 14%
- 32%

### 2. La schizofrenia risulta più frequente:

- Nei paesi in via di sviluppo
- Nei paesi economicamente arretrati
- Nei paesi sviluppati
- Non ci sono differenze

### 3. Riguardo alla disfunzione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene nella depressione

- Il picco mattutino del cortisolo si presente comunque anche dopo somministrazione serale di 1mg di desametasone
- Il picco mattutino del cortisolo si presente comunque anche dopo somministrazione serale di 2mg di desametasone
- Il picco mattutino del cortisolo non si presente comunque anche dopo somministrazione serale di 1mg di desametasone
- Il picco mattutino del cortisolo non si presente comunque anche dopo somministrazione serale di 2mg di desametasone

### 4. Se un soggetto ha un familiare di primo grado affetto da Disturbo da Panico quale è la probabilità che sviluppi a sua volta lo stesso disturbo?

- 5%
- 1.5%
- 10%
- 13%

**5. Qual è il tasso di ricaduta a 5 anni in un paziente affetto da Disturbo depressivo?**

- 47%
- 23%
- 40%
- 17%

**6. Il disturbo Depressivo Maggiore con manifestazione atipiche è caratterizzato da:**

- Umore costantemente flesso da quindici giorni, difficoltà di concentrazione, deliri atipici o bizzarri
- Sensitività interpersonale, paralisi plumbea, umore costantemente flesso da almeno quindici giorni
- Sensitività interpersonale, reattività dell'umore, ipersonnia
- Reattività dell'umore, inibizione psicomotoria, paralisi plumbea

**7. L'influenza genetica nello sviluppo del DOC**

- È rilevante, con una ereditabilità del 46%
- È rilevante, con una ereditabilità del 32%
- È rilevante, ma solamente nei casi più gravi
- È rilevante, ma solamente nei gemelli omozigoti

**8. Il disturbo d'ansia generalizzata è più frequente**

- In soggetti anziani
- In soggetti giovani
- In soggetti di mezza età
- Non ci sono differenze

**9. La percentuale di pazienti affetti da DOC che non rispondono alle terapie è:**

- 30%
- 27%
- 14%
- 5%